

ICS 65.020.30
B 43

团体标准

T/CAAA XXXX—2019

澳洲白绵羊

Australian white sheep breed
(征求意见稿)

2019-XX-XX 发布

2019-XX-XX 实施

中国畜牧业协会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国畜牧业协会提出并归口。

本标准起草单位：天津奥群牧业有限公司、天津奥群羊业研究院有限公司、中国农科院北京畜牧兽医研究所。

本标准主要起草人：张清峰、伍仁贵、卢小芳、张莉、段崇杰、梅宇耕、赵京峰、赵军军、艾春燕、刘莹、陈华。

澳洲白绵羊

1 范围

本标准规定了澳洲白绵羊品种来源及分布、外貌特征、生产性能、等级评定及生产性能测定方法。

本标准适用于澳洲白绵羊的种羊的鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

3 品种来源及分布

澳洲白绵羊原产于澳大利亚新南威尔士州。是澳大利亚澳洲白绵羊育种者协会集成了白头杜泊绵羊，万瑞绵羊，无角陶赛特羊和特克塞尔的品种优良基因，采取特定比例的基因组合培育而成的粗毛型专门化肉羊品种。现分布于澳大利亚、中国等地。

4 外貌特性

公、母均为无角，头和体躯白色。皮厚、被毛为粗毛粗发。头略短小，宽度适中，鼻梁宽大，略微隆起，耳大向外平展，颈长粗壮。肩胛宽平，胸深，背腰长而宽平，臀部宽而长，后躯深，肌肉发达饱满，侧看体躯呈长方形，后视呈方形。体质结实，结构匀称，四肢健壮，前腿垂直，后腿分开宽度适中，蹄质结实呈灰色或黑色。澳洲白绵羊种羊外貌特征参见附录 A。

5 生产性能

5.1 繁殖性能

5.1.1 母羊

母羊常年发情，性成熟在 8 月龄左右，初次配种年龄在 10 月龄~12 月龄。母羊发情周期在 14d~20d，妊娠期在 147d~150d，母性和泌乳能力较强，产羔率为 132%~182%。

5.1.2 公羊

公羊可常年配种，初配年龄在 12 月龄~14 月龄。

5.2 产肉性能

产肉性能见表 1。

表1 澳洲白绵羊种羊产肉性能

月龄	屠宰率 %	胴体重 kg
公、母6月龄	50~52	23~27
12月龄公羊	52~55	45~48
12月龄母羊	51~53	36~38
成年公羊	50~52	50~55

5.3 体尺和体重

体长和体重见表2。

表2 澳洲白绵羊种羊体尺和体重

年龄	体重 kg	体高 cm	体长 cm	胸围 cm
12月龄公羊	80~90	75~85	75~85	97~102
12月龄母羊	70~75	73~80	71~75	95~100
24月龄公羊	95~120	80~85	85~90	100~110
24月龄母羊	85~90	75~80	79~82	100~107

6 等级评定

6.1 特级

符合本品种外貌特征，体尺和体重超过表3指标15%的优秀个体。

表3 一级羊体尺和体重指标

性别	年龄	体重 kg	体高 cm	体长 cm	胸围 cm
公	3月龄	35	-	-	-
	6月龄	65	65	65	90
	12月龄	80	75	75	97
	24月龄	95	80	85	100
母	3月龄	30	-	-	-
	6月龄	50	60	62	85
	12月龄	70	73	71	95
	24月龄	85	75	79	100

6.2 一级

符合本品种外貌特征，体尺和体重达到表3指标的个体。

6.2 二级

符合本品种外貌特征，体尺体重低于表3指标15%的个体。

7 生产性能测定

各性能测定方法按 NY/T 1236 的规定执行。



附录 A
(资料性附录)
澳洲白绵羊种羊

A1 澳洲白绵羊种公羊

- A1.1 侧面
- A1.2 正面
- A1.3 后躯



图 A1 澳洲白绵羊种公羊

A2 澳洲白绵羊种母羊

- A2.1 侧面
- A2.2 正面
- A2.3 后躯



图 A2 澳洲白绵羊种母羊