

ICS 65.020.30
B 43

团体标准

T/CAAA ×××—2019

白头杜泊绵羊

White dorper sheep breed
(征求意见稿)

2019-××-××发布

2019-××-××实施

中国畜牧业协会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国畜牧业协会提出并归口。

本标准起草单位：天津奥群牧业有限公司、天津奥群羊业研究院有限公司、中国农科院北京畜牧兽医研究所。

本标准主要起草人：张清峰、伍仁贵、卢小芳、张莉、段崇杰、梅宇耕、赵京峰、张鹏飞、李若亮、王成、陈华。

白头杜泊绵羊

1 范围

本标准规定了白头杜泊绵羊品种来源及分布、外貌特征、生产性能、等级评定及生产性能测定方法。

本标准适用于白头杜泊绵羊的种羊的鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

3 品种来源及分布

白头杜泊绵羊原产于南非共和国。是用英国的有角陶赛特公羊与当地的波斯黑头母羊杂交，经选择和培育形成的肉用绵羊。现分布于南非、西亚、澳大利亚、新西兰和中国等地。

4 外貌特性

公、母均为无角，头和体躯白色。皮厚、被毛为短毛粗发。发头顶部平直、长度适中，额宽，鼻梁微隆，耳小而平直，向前下方倾斜。颈长适中，胸宽而深，背腰平宽，前胸丰满，后躯肌肉发达。体质结实，结构匀称，四肢强健而长度适中，肢势端正，蹄质坚实。白头杜泊绵羊种羊外貌特征参见附录 A。

5 生产性能

5.1 繁殖性能

5.1.1 母羊

母羊常年发情，性成熟在 5 月龄~8 月龄，初次配种年龄在 8 月龄~10 月龄。母羊发情周期在 14d~19d，妊娠期在 147d~150d，母性和泌乳能力较强，产羔率为 130%~180%。

5.1.2 公羊

公羊可常年配种，初配年龄在 10 月龄~12 月龄。

5.2 产肉性能

产肉性能见表 1。

表1 白头杜泊绵羊种羊产肉性能

月龄	屠宰率 %	胴体重 kg
6月龄	51~53	25~27
12月龄公羊	53~58	44~48
12月龄母羊	52~56	34~37
24月龄公羊	50~52	50~55

5.3 体尺和体重

体尺和体重见表2。

表2 白头杜泊绵羊种羊体尺和体重

年龄	体重 kg	体高 cm	体长 cm	胸围 cm
12月龄公羊	75~85	70~75	71~80	100~105
12月龄母羊	65~70	60~65	61~70	89~95
24月龄公羊	95~120	75~80	75~85	105~110
24月龄母羊	75~90	65~75	70~80	95~100

6 等级评定

6.1 特级

符合本品种外貌特征，体尺和体重超过表3指标15%的优秀个体。

表3 一级羊体尺和体重指标

性别	年龄	体重 kg	体高 cm	体长 cm	胸围 cm
公	3月龄	31	-	-	-
	6月龄	50	55	61	85
	12月龄	75	70	71	100
	24月龄	95	75	75	105
母	3月龄	30	-	-	-
	6月龄	45	50	50	70
	12月龄	65	60	61	89
	24月龄	75	65	70	95

6.2 一级

符合本品种外貌特征，体尺和体重达到表3指标的个体。

6.2 二级

符合本品种外貌特征，体尺和体重低于表3指标15%的个体。

7 生产性能测定

性能测定方法按NY/T 1236的规定执行。

附录 A
(资料性附录)
白头杜泊绵羊种羊

A1 白头杜泊绵羊种公羊

A1.1 侧面

A1.2 正面

A1.3 后躯



图 A1 白头杜泊绵羊种公羊

A2 白头杜泊绵羊种母羊

A2.1 侧面

A2.2 正面

A2.3 后躯



图 A2 白头杜泊种母羊