

ICS 65.020.30  
B 43

# 团体标准

T/CAA xxx—2019

---

## 夏洛莱羊

Charollais sheep breed  
(征求意见稿)

2019-XX-XX 发布

2019-XX-XX 实施

中国畜牧业协会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国畜牧业协会提出并归口。

本标准起草单位：朝阳市朝牧种畜场有限公司、朝阳市农业农村局、辽宁省畜牧科学院、朝阳市动物种源中心。

本标准主要起草人：王国春、张贺春、黄承均、朱延旭、卢继华、马金友、于波、潘国立、庞久龙、陈波、李淑秋、丁海滨、刘海彪、王殿毕、姜海、霍宝增、陈晓玉、陈恩秋。

# 夏洛莱羊

## 1 范围

本标准规定了夏洛莱羊品种来源及分布、外貌特征、生产性能、等级评定及生产性能测定方法。本标准适用于夏洛莱羊种羊的鉴定及评定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1236 绵、山羊生产性能测定技术规范

## 3 品种来源及分布

夏洛莱羊原产于法国中东部摩尔万山脉至夏洛莱山谷和布莱斯平原地区，以英国莱斯特羊和南丘羊为父本与当地的细毛羊（摩尔万戴勒羊）杂交育成，是世界上著名的肉羊品种之一。1963年命名为夏洛莱羊，1974年法国农业部正式承认为肉用品种羊，是主要用于肥羔生产的杂交父本。现在分布于英国、德国、澳大利亚等地，1988年引入中国。

## 4 外貌特征

公母羊均无角，头部无毛或少毛，略呈粉红色或灰色，少数个体带有灰黑色斑点。两眼之间距离大，耳朵细长竖立，灵活能动且与头部颜色相同。额宽、颈较短、胸宽而深，背腰平直、体长，躯干呈圆桶型。后臀丰满，肌肉发达，肢势端正，两后肢距离大，呈倒“U”型。四肢较短无长毛。蹄质坚实。被毛同质乳白色，细、密、短。夏洛莱羊种羊外貌特征见附录 A。

## 5 生产性能

### 5.1 繁殖性能

5.1.1 母羊季节性发情，在 9、10 月份相对集中。母羊 7 月龄性成熟，8 月龄即可配种。母羊发情周期在 14d~20d，妊娠期在 147d~152d。初产母羊产羔率为 130%~140%，经产母羊可达 172%~200%。母性好，泌乳力强。

5.1.2 公羊常年配种。公羊 9 月龄~12 月龄即可采精配种。

### 5.2 产肉性能

应符合表 1 的要求。

表 1 夏洛莱羊种羊产肉性能

月龄	屠宰率 %	胴体重 kg
3月龄	50~53	15.0~17.3
6月龄母羊	50~53	20.2~26.5
6月龄公羊	53~55	23.9~33.0
12月龄母羊	52~55	36.4~44.0
12月龄公羊	55~58	46.8~55.1

### 5.3 体尺体重

应符合表2的要求。

表2 夏洛莱羊种羊体尺体重

月龄	体重 kg	体长 cm	胸围 cm	体高 cm
6月龄母羊	44.6~53.1	76~83	85~95	53~63
6月龄公羊	50.5~63.8	79~85	89~96	56~63
12月龄母羊	70.2~82.4	90~97	98~108	61~67
12月龄公羊	85.0~101.5	95~103	115~122	70~77

### 5.4 毛用性能

成年公羊剪毛量为2.0kg~2.5kg，成年母羊剪毛量为1.8kg~2.5kg，毛长主要分布在3cm~6cm；毛细29微米~30.5微米为主；油汗中等，无干死毛。

## 6 等级评定

### 6.1 特级

符合本品种外貌特征、体重超过表3指标10%的优秀个体。

表3 夏洛莱羊种羊一级羊体重和体尺指标

月龄	体重 kg	体长 cm	胸围 cm	体高 cm
3月龄母羊	30	62	63	51
3月龄公羊	32	64	65	52
12月龄母羊	75	93	102	64
12月龄公羊	95	99	115	74
30月龄母羊	85	96	105	67
30月龄公羊	114	102	120	77

### 6.2 一级

符合本品种外貌特征、体尺体重达到表3指标的个体。

### 6.3 二级

符合本品种外貌特征、母羊体重低于表 3 指标 10%的个体。

## 7 生产性能测定方法

各项性能测定方法按照 NY/T 1236 的规定执行。



附录 A  
(资料性附录)  
夏洛莱羊种羊

A.1 夏洛莱羊种公羊

见图 A.1




图 A.1 夏洛莱羊种公羊

A.2 夏洛莱羊种母羊

见图 A.2



图 A.2 夏洛莱羊种母羊