

附件

人参

Renshen

GINSENG RADIX ET RHIZOMA

农药残留量 照农药残留量测定法(附录 2341 有机氯类农药残留量测定第二法)测定。

含~~六六六(α -BHC, β -BHC, γ -BHC, δ -BHC 之和)不得过 0.2mg/kg, 总滴滴涕(pp' -DDE, pp' -DDD, op' -DDT, pp' -DDT 之和)不得过 0.2mg/kg, 五氯硝基苯不得过 0.1mg/kg; 六氯苯不得过 0.1mg/kg; 七氯(七氯、环氧七氯之和)不得过 0.05mg/kg; 艾氏剂不得过 0.05mg/kg, 氯丹(顺式氯丹、反式氯丹、氧化氯丹之和)不得过 0.1mg/kg。~~

山楂

Shanzha

CRATAEGI FRUCTUS

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法(附录 2321)测定, 铅不得过 5mg/kg; 镉不得过 ~~0.3~~1mg/kg; 砷不得过 2mg/kg; 汞不得过 0.2mg/kg; 铜不得过 20mg/kg。

丹参

Danshen

SALVIAE MILTIORRHIZAE RADIX ET RHIZOMA

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法(附录 2321)测定, 铅不得过 5mg/kg, 镉不得过 ~~0.3~~1mg/kg, 砷不得过 2mg/kg, 汞不得过 0.2mg/kg, 铜不得过 20mg/kg。

甘草

Gancao

GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法(附录 2321)测定,铅不得过 5mg/kg,镉不得过 ~~0.3~~ 1mg/kg,砷不得过 2mg/kg,汞不得过 0.2mg/kg,铜不得过 20mg/kg。

有机氯农药残留量 照农药残留量测定法(附录 2341 有机氯类农药残留量测定)测定。

含~~总六六六(α -BHC、 β -BHC、 γ -BHC、 δ -BHC 之和)不得过 0.2mg/kg,总滴滴涕(pp' -DDE、 pp' -DDD、 op' -DDT、 pp' -DDT 之和)不得过 0.2mg/kg;~~五氯硝基苯不得过 0.1mg/kg。

白芍

Baishao

PAEONIAE RADIX ALBA

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法(附录 2321)测定,铅不得过 5mg/kg;镉不得过 ~~0.3~~ 1mg/kg;砷不得过 2mg/kg;汞不得过 0.2mg/kg;铜不得过 20mg/kg。

金银花

Jinyinhua

LONICERAE JAPONICAE FLOS

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法(附录 2321)测定,铅不得过 5mg/kg;镉不得过 ~~0.3~~ 1mg/kg;砷不得过 2mg/kg;汞不得过 0.2mg/kg;铜不得过 20mg/kg。

枸杞子

Gouqi zi

LYCII FRUCTUS

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法（附录 2321）测定，铅不得过 5mg/kg；镉不得过 ~~0.3~~ 1mg/kg；砷不得过 2mg/kg；汞不得过 0.2mg/kg；铜不得过 20mg/kg。

黄芪

Huangqi

ASTRAGALI RADIX

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法（附录 2321）测定，铅不得过 5mg/kg；镉不得过 ~~0.3~~ 1mg/kg；砷不得过 2mg/kg；汞不得过 0.2mg/kg；铜不得过 20mg/kg。

有机氯农药残留量 照农药残留量测定法（附录 2341 有机氯类农药残留量测定法—第一法）测定。

含~~总六六六(α -BHC、 β -BHC、 γ -BHC、 δ -BHC 之和)不得过 0.2mg/kg, 总滴滴涕(pp' -DDE、 pp' -DDD、 op' -DDT、 pp' -DDT 之和)不得过 0.2mg/kg, 五氯硝基苯不得过 0.1mg/kg。~~