

附件 2 略

附件 3 略

附件 4

说明书和标签

猫鼻气管炎、嵌杯病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（CP2 株+CC3 株+VP2 蛋白）说明书和内包装标签

（一）猫鼻气管炎、嵌杯病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（CP2 株+CC3 株+VP2 蛋白）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 猫鼻气管炎、嵌杯病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（CP2 株+CC3 株+VP2 蛋白）

商品名 无

英文名 Feline Rhinotracheitis, Calicivirosis and Panleukopenia Vaccine, Inactivated (Strain CP2+ Strain CC3+ Protein VP2)

汉语拼音 Mao Biqiguanyan、Qianbeibingdubing、Fanbaixibaojianshaozheng Sanlian Miehuoyimiao (CP2 Zhu+ CC3 Zhu+ VP2 Danbai)

【主要成分及含量】 疫苗中含有灭活的猫鼻气管炎 CP2 株、猫嵌杯病毒 CC3 株和猫泛白细胞减少症病毒 VP2 蛋白，灭活前每 ml 疫苗中含有猫鼻气管炎病毒 CP2 株为 $10^{7.54}$ TCID₅₀，猫嵌杯病毒 CC3 株为 $10^{8.54}$ TCID₅₀，猫泛白细胞减少症病毒 FPV-VP2 株 VP2 蛋白的血凝素凝集价为 1 : 2⁹。

【性状】 静置后，上层为淡粉色液体，下层可有淡粉色少量沉淀，振摇后呈均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防猫鼻气管炎、猫嵌杯病毒病、猫泛白细胞减少症。二免接种后 21 日产生免疫力，免疫持续期为 12 个月。

【用法与用量】 皮下注射。8~9 周龄健康猫首次免疫 3 次，每次 1ml，间隔 3~4 周；10 周龄或 10 周龄以上健康猫首次免疫 2 次，每次 1ml，间隔 3~4 周。每年加强免疫 1ml。

【不良反应】 暂无可见不良反应。

【注意事项】 （1）仅用于接种 8 周龄或 8 周龄以上健康猫，孕猫禁用。

（2）使用前应将疫苗恢复至常温，并振荡均匀。

（3）本品严禁冻结，避免阳光直射与高温。

（4）疫苗瓶开启后，应一次用完。

（5）接种疫苗时，应执行常规的无菌操作，及时更换针头。

（6）接种期间应避免调动、运输和饲养管理条件骤变，并避免与潜在感染源接触。

(7) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 24 个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 猫鼻气管炎、嵌杯病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗 (CP2 株+CC3 株+VP2 蛋白) 内包装标签

兽用

猫鼻气管炎、嵌杯病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗

(CP2 株+CC3 株+VP2 蛋白)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 详见说明书。

【用法与用量】 皮下注射。8~9 周龄健康猫首次免疫 3 次，每次 1ml，间隔 3~4 周；10 周龄或 10 周龄以上健康猫首次免疫 2 次，每次 1ml，间隔 3~4 周。每年加强免疫 1ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 24 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用